


Den nye op(løsning) mod hypertension

Semintra® (telmisartan) 10 mg/ml oral opløsning til katte er den første angiotensinreceptorblokker (ARB), som er godkendt til behandling af hypertension hos katte. Den unikke, målrettede virkningsmekanisme sørger for langvarig kontrol af blodtrykket. Og da Semintra® er en væskeformig formulering, som er nem at give, accepteres den af de fleste katte, så det er nemt at administrere den.



Semintra® (telmisartan) Til kat. Oral opløsning 10 mg/ml.
Præsentation: Telmisartan er en oralt aktiv og specifik angiotensin II-receptor antagonist, der forårsager et dosisafhængigt fald i middelarterieblodtrykket. Der ses en reduktion i proteinuri inden for de første 7 dage efter start af behandling. **Indikationer:** Til behandling af systemisk hypertension hos katte. **Bivirkninger:** Milde og forbigående gastrointestinale symptomer såsom diarré og opkastning. Forhøjede leverenzymen er meget sjældent observeret. Hypotension og fald i antal røde blodlegemer kan tilskrives den farmakologiske aktivitet. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes ved drægtighed eller dregivning. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne. **Interaktioner:** Der er begrænsede data tilgængelige vedrørende interaktioner mellem telmisartan og lægemidler der nedsætter blodtrykket (f.eks. amlodipin) eller som påvirker RAAS (f.eks. ACEI) hos katte med hypertension. Kombination med disse typer midler kan medføre additive hypotensive virkninger eller ændring af nyrefunktionen. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Sikkerhed og virkning af telmisartan til behandling af systemisk hypertension over 200 mmHg er ikke undersøgt. På

grund af virkningsmekanismen kan der forekomme forbigående hypotension. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: I tilfælde af indgift søges lægehjælp. Undgå øjenkontakt. Vask hænder efter brug. Gravide kvinder bør tage særlige forholdsregler for at undgå kontakt med produktet. **Dosering og indgivelse:** Anbefalet dosis er 2 mg telmisartan/kg legemsvægt (0,2 ml/kg legemsvægt) en gang dagligt, direkte i munden eller sammen med lidt foder. Doseret ved hjælp af doseringsprojekten. Efter 4 uger kan doseringen efter dyrlægens skøn reduceres (i 0,5 mg/kg intervaller). **Bemærkning:** Efter administrering af op til 2,5 gange anbefalet dosis i 6 måneder observeredes ingen bivirkninger andre end de tidligere nævnte. Overdosering af produktet (2,5 gange anbefalet dosis i 6 måneder) sås et markant fald i blodtryk, fald i antal af røde blodlegemer og en stigning i blod-urea-nitrogen (BUN). I tilfælde af hypotension iværksættes symptomatisk behandling, f.eks. væsketerapi. **Pakning og pris:** 35 ml. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen for mere information. *Baseret på produktresumé 2018-05.*



NY INDIKATION

Semintra
telmisartan
THE SOLUTION