

PUREVAX®

Always closer to your needs



PUREVAX GØR DET MULIGT AT FØLGE EKSPERTERNES ANBEFALINGER*:

- Op til 3 års beskyttelse mod RCP og rabies
- Variant med Chlamydia felis
- Sterilt vand, Purevax FeLV eller Purevax rabies kan bruges som solvens

KATTEVACCINER FRA BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH

✓ Rhinotracheitis / Herpes (R)	✓ Chlamydia felis (Ch)
✓ Calicivirus (C)	✓ Felint leukemi (FeLV)
✓ Panleukopeni / Kattesyge (P)	✓ Rabies (rabies)



* The European Advisory Board on Cat Diseases www.abccdcatsvets.org/matrix-2, WSAVA Vaccination Guidelines www.wsava.org/guidelines/vaccination-guidelines

PRODUKTINFORMATION

Purevax. Vaccinstammer: R: Svækket feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 stamme). C: Dræbte feline calicivirus antigener (FCV 431 og G1 stammer). P: Svækket feline panleukopeni virus (PLI IV). Ch: Svækket *Chlamydia felis* (905 stamme). FeLV: FeLV rekombinant canarypox virus (vCP97). Rabies: Rabies rekombinant canarypox virus (vCP65). **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Merial, Lyon, Frankrig. **Indikationer:** aktiv immunisering af katte, der er 8 uger eller ældre, mod hhv. feline viral rhinotracheitis og *Chlamydia felis* infektion for at reducere kliniske tegn, mod calicivirus infektion for at reducere kliniske tegn og virusudskillelse, mod feline panleukopeni til forebyggelse af dødsfald og kliniske tegn, mod leukæmi til forebyggelse af persistent viræmi og kliniske tegn på sygdommen og aktiv immunisering af katte for at forebygge dødsfald pga. rabiesinfektion. For rhinotracheitis, calicivirose, panleukopeni og chlamydiose indtræder immuniteten 1 uge efter basisvaccination. For leukæmi indtræder immuniteten 2 uger efter basisvaccination. Interaktioner: Merial's combo vacciner uden adjuvans kan kombineres med en rekombinant vaccine (Purevax FeLV eller Purevax Rabies), det anbefales ikke at blande FeLV og Rabies i samme vaccine. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes under drægtighed og diegivning. **Bivirkninger:** Apati og anoreksi samt hypertermi (af 1 til 2 dages varighed) kan af og til forekomme samt lokal reaktion (letsmerter ved berøring, kløe eller lethævelse), der vil forsvinde inden for højst 1 til 2 uger. Yderst sjældent ses hypersensitivitetsreaktion. Gældende for Purevax vacciner indeholdende *Chlamydia felis*: Hypertermi og letargi, der sommetider er forbundet med halvhed, er i meget sjældne tilfælde observeret én til tre uger efter revaccination af voksne katte. Reaktionen var forbigående. **Forsigtighedsregler:** Vacciner kun raske dyr. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægsmedlen eller etiketten bør vises til lægen. Test for FeLV antigenæmi bør udføres forud for vaccination med vacciner indeholdende FeLV. FeLV positive dyr bør ikke vaccineres. **Dosering:** 1 ml s.c. efter opløsning af den frysetørrede pille i solvens. **Basisvaccination:** første injektion fra 8-ugers alderen; anden injektion: 3-4 uger senere. Ved tilstedeværelse af høje værdier af materielle antistoffer, bør basisvaccination vente til killingerne er 12-uger gamle. For Purevax Rabies: 1 injektion fra 12-ugers alderen. **Revaccination:** 1 år efter basisvaccination gældende for alle komponenter, efterfølgende revaccinationer skal foretages hvert år for chlamydiose og feline leukæmi komponenterne og med intervaller på op til tre år for rhinotracheitis, calicivirus, panleukopeni og rabies komponenterne. **Pakninger og priser:** Pakninger à 10x1 doser. Purevax Rabies: Pakninger à 2x1 doser. Se aktuel dagspris på medicinpriser.dk. **Udl. B.** Pligtteksten er forkortet i forhold til de af EMA godkendte produktresuméer. Disse kan vederlagsfrit rekvireres fra Boehringer Ingelheim Animal Health eller på www.ema.europa.eu

 **Boehringer
Ingelheim**