ERAVAC

Inaktiveret vaccine, emulsion, mod Rabbit Haemorrhagic Disease type 2 (RHDV2)

- ✓ Til aktiv immunisering af kaniner fra 30 dage
- ✓ Koncentreret formulering (dosis 0,5 ml)
- ✓ Hurtig beskyttelse: 7 dage post-vaccination
- ✓ Immunitetens varighed: 9 måneder
- ✓ Beskyttende antistoffer opretholdes i 12 måneder
- ✓ Pakninger: 1 hætteglas med 10 doser samt pakning med 10 hætteglas á 1 dosis

ERAVAC Inaktiveret vaccine mod kanin hæmoragisk sygdom (Rabbit Haemorrhagic Disease) type 2 virus (RHDV2), i injicerbar emulsion. **SAMMENSÆTNING:** Hver dosis på 0,5 ml indeholder: Inaktiveret kanin hæmoragisk sygdom type 2 virus (RHDV2), strain V-1037 ≥70 % cELISA40. **INDIKATIONER:** *Kaniner*: Til aktiv immunisering af kaniner fra alderen 30 dage til at reducere dødelighed forårsaget af kanin hæmoragisk sygdom type 2 virus (RHDV2). **INDGIVELSESVEJ:** S. C. **DOSERING:** 0,5 ml/dyr. BIVIRKNINGER: Meget almindelig: Der kan opstå en forbigående temperaturstigning til lidt over 40 °C mellem to og tre dage efter vaccinationen. Denne lette temperaturstigning ophører spontant uden behandling. Knuder eller hævelse (<2 cm) kan observeres på injektionsstedet. De reduceres gradvist og forsvinder uden behov for behandling. **TILBAGEHOLDELSESTID:** 0 dage. SÆRLIGE **FORHOLDSREGLER:** Vaccinen yder kun beskyttelse mod RHDV2. Krydsbeskyttelse mod klassisk RHDV er ikke påvist. Anbefales, hvor RHDV2 er epidemiologisk relevant. Kun raske kaniner skal vaccineres. Særlige forholdsregler: Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser. Søg læge. **OPBEVARING:** Nedkølet (2 °- 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys. Brug produktet straks efter åbning. **ANDRE OPLYSNINGER:** Immunitetens ikrafttræden: 1 uge. Immunitetens varighed: 9 måneder påvist ved "challenge". Immunologiske egenskaber: Vaccination af kaniner inducerede produktionen af hæmagglutinationsinhiberende antistoffer, der bestod i mindst 12 måneder. **DRÆGTIGHED:** Laboratorieforsøg med hunkaniner i den sidste tredjedel af drægtighed har ikke afsløret nogen tegn på teratogene, føtotoksiske eller materno-toksiske virkninger. **PAKNINGER:** 10 hætteglas med 1 dosis, 1 hætteglas med 10 doser. **MT NUMRE:** EU/2/16/199/001-002-003. **INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN:** Laboratorios Hipra S.A. Avda. La Selva, 135, 17170 Amer (Girona), SPANIEN. **DANSK REPRÆSENTANT:** HIPRA NORDIC ApS, Ådalen 7C, 6600 Vejen. **UDLEVERINGSGRUPPE:** BP. Produktresuméet er ikke gengivet i sin helhed, hvorfor det kan udleveres efter ønske hos HIPRA Nordic eller hentes på http://www.ema.europa.eu.

HIPRA

The **Reference** in **Prevention** for **Animal Health**

HIPRA Nordic
Ådalen 7 C, 6600 Vejen, Danmark
Tel.: (+45) 88 44 50 30 · Fax: (+45) 69 66 34 00 · danmark@hipra.com · www.hipra.com

NASYM®

Levende, svækket vaccine mod BRS virus til IN og IM administration

Den eneste **BRSV** vaccine - både til IN & IM

NASYM® lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension eller næsespray til kvæg. **INDHOLD PR DOSIS (2 ml)**: Lyofilisat: Aktivt stof: Levende, svækket bovint respiratorisk syncytial virus (BRSV), stamme Lym-56 $10^{4,7 - 6,5}$ $CCID_{50}$. Solvens: Phosphatbufferopløsning. **INDIKATIONER**: Aktiv immunisering af kvæg for at reducere virusspredning og kliniske luftvejssymptomer på grund af infektion med bovint respiratorisk syncytial virus. Indtræden af immunitet: 21 dage efter intranasal administration af 1 dosis. 21 dage efter den anden dosis i forløbet med to doser intramuskulære vaccinationer. Varighed af immunitet: 2 måneder efter intranasal vaccination. 6 måneder efter intramuskulær vaccination. Reduktion af respiratoriske kliniske symptomer er set 5 dage efter intranasal vaccination. **BIVIRKNINGER:** Almindeligt: Der kan ses lettere ændringer i afføringens konsistens efter vaccinationen. Ikke almindeligt: Der kan observeres en stigning i temperatur på mindst 1,7 °C to dage efter vaccinationen, som går over den følgende dag uden behandling. **DOSERING OG ADMINISTRATION**: Intranasal eller intramuskulær anvendelse. Følgende doser og administrationsmetoder bør anvendes: Kvæg, fra de er 9 dage gamle: Primær vaccination (intranasal brug): Sprøjt 1 ml i hvert næsebor (så den samlede indgivne mængde er 2 ml). Revaccination: Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml 2 måneder efter den primære vaccination, og derefter hver 6. måned efter den seneste revaccination. Kvæg, fra de er 10 uger gamle: Primær vaccination (intramuskulær injektion): Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml, efterfulgt af en yderligere intramuskulær injektion på 2 ml, givet 4 uger efter. Revaccination: En intramuskulær injektion på 2 ml gives 6 måneder efter afslutningen af det primære vaccinationsforløb og derefter hver 6. måned efter den sidste revaccination. Rekonstituér vaccinen med den passende mængde solvens. **OVERDOSERING**: Ingen andre bivirkninger end de ovenfor anførte. **TILBAGEHOLDELSESTID**: 0 dage. **HOLDBARHED**: I salgspakning: 15 måneder. Efter rekonstituering ifølge anvisning: Anvendes straks. **SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER**: Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Vaccinér kun raske dyr. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Kun til veterinær brug. **DRÆGTIGHED OG LAKTATION**: Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. **INTERAKTIONER**: Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. **OPBEVARING**: Lyofilisat: Opbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys. Solvens: Opbevares under 25°C. Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys. Opbevares utilgængeligt for børn. **PAKNINGER**: 1 hætteglas med lyofilisat à 5 doser + 1 hætteglas à 10 ml solvens, 1 hætteglas med lyofilisat à 25 doser + 1 hætteglas à 50 ml solvens. **INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE**: Laboratorios Hipra, S.A. Amer (Girona), SPAIN. **DANSK REPRÆSENTANT**: HIPRA Nordic ApS, Ådalen 7 C, 6600 Vejen. **UDLEVERINGSGRUPPE**: BP. Produktresuméet er ikke gengivet i sin helhed, hvorfor det kan udleveres efter ønske hos HIPRA Nordic eller hentes på http://www.ema.europa.eu.

The **Reference** in **Prevention** for **Animal Health**

HIPRA Nordic
Ådalen 7 C, 6600 Vejen, Danmark
Tel.: (+45) 88 44 50 30 · Fax: (+45) 69 66 34 00 · danmark@hipra.com · www.hipra.com